

## Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2024. години

34. недеља (19–25. август 2024. године)

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” на територији Републике Србије до 26.8.2024. године регистровано је 20 аутохтоних случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији. Пријављени случајеви су са територије: Града Београда (пет случајева), Јужнобанатског (пет случајева), Јужнобачког (два случаја), Средњобанатског (два случаја), Западнобачког (два случаја), Севернобачког (један случај), Браничевског (један случај), Подунавског (један случај) и Мачванског (један случај) округа. Од укупног броја оболелих 14 особа је мушког пола, док су шест женског. Просечна старост оболелих је 58,1 година.

Такође, на територији Мачванског округа регистрован је и један случај грознице Западног Нила са вероватним местом заражавања у Грчкој.

У сезони надзора 2024. године, до 21.8.2024. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) пријављен је 201 случај оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији, и то у: Грчкој (66), Италији (76), Шпанији (12), Француској (седам), Мађарској (13), Аустрији (10), Румунији (14) и Хрватској (три). Ван ЕУ/ ЕЕЗ случајеви ГЗН се региструју и у Албанији.

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода [комараца](#), и то:

- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места

на које комарци могу да polože своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.

- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

## Грозница Западног Нила

### Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити увод комарца.



- Носити комотну одећу светлих боја, дуги рукава и ногавица, јер комарци убадају кроз прилијепу одећу.





- Током борава не отварајте дану и ноћу користити репеленте за кожу!
- Наносити репелент само на отворене делове тела!
- Користити само регистрована репеленте\* чије су активне супстанце N, N-ди-п-толуамид, перметрин, ултрапавида, итд!
- Креме са УВ заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство произвођача!
- Не наносити репелент на кожу испод одеће!



- Не користити репелент код новорођенчади млађе од два месеца старости, већ их обући у одећу дугих рукава и ногавица, а колико, кривце и носилке заштитити мрежама за заштиту беба од комараца!
- Родитељи, нанесите репелент на своје шаке па затим на лице вашег детета!
- Не наносити репелент на шаке, уста, очи и оштећену/иритирану кожу детета!
- Пратити упутство произвођача када се наноси репелент на кожу дечије!

**Заштитите просторије од комараца!**

- Бораваће у климатизованим просторијама са затвореним вратима и прозорима или у просторијама са постављеним комарницама (заштитним мрежама против комараца на вратима и прозорима)
- Користити заштитну мрежу око кревета када:
  - просторија није климатизована,
  - просторија није коварирана,
  - спаваће на отвореном!

\* Репеленти у складу са „Директивом Европске Комисије о репелентима“, Министарства за заштиту животне средине Републике Србије (према списицима за регистрацију репелентних супстанција, доступних на веб-сајту Министарства за заштиту животне средине Републике Србије – [www.mps.gov.rs](http://www.mps.gov.rs))



www.batut.org.rs

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб стране ([www.batut.org.rs](http://www.batut.org.rs)) и средстава јавног информисања.